

# Formagyn : Recommandations OMS 1/4



		Oestro-progestatifs	Progestatifs oraux	Nexplanon°	DIU Cuivre	SIU Mirena°			
Âge	Ménarche - 18	1	1	2	2	2			
	18 - 20	1	1	1	2	2			
	20 - 40	1	1	1	1	1			
	40 - 45	2	1	1	1	1			
	> 45	2	1	2	1	1			
Parité	Nulliparité	1	1	1	2	2			
	Primi - Multi	1	1	1	1	1			
Allaitement (VB - César)	0 - 48 h	4	2	2	1	2			
	48 h - 4 sem	4	2	2	3	3			
	4 sem - 6 sem	4	2	2	1	1			
	6 sem - 6 mois	3	2 si partiel <sup>5</sup>	1	1	1			
	> 6 mois	2	1	1	1	1			
Hors allaitement (VB - César)	0 - 48 h	4 si FDR*	3	1	1	1 <sup>1</sup>			
	48 h - 21 j			1	3	3			
	21 j - 4 sem	3 si FDR*	2	1	3	3			
	4 sem - 6 sem			1	1	1			
	> 6 sem	1	1	1	1	1			
Post-abortum	1er trim.	1*	1*	1*	1*	1*			
	2e trim.	1	1	1	2	2			
	septique immédiat	1	1	1	4	4			
GEU	Antécédent	1	2	1	1	1			
Chirurgie	Pelvienne (ATCD)	1	1	1	1	1			
	Immobil. prolongée	4	2	2	1	2			
	lourde sans immobil.	2	1	1	1	1			
	légère sans immobil.	1	1	1	1	1			
Obésité	IMC ≥ 30	2	1	1	1	1			
Thrombose profonde / Embolie	Antécédent	4	2	2	1	2			
	En cours	4	3	3	1	3			
	Sous anticoag.	4	2	2	1	2			
	ATCD familiaux	2	1	1	1	1			
Thromboses autres	Thrombophilie	4*	2*	2*	1*	2*			
	Varices	1	1	1	1	1			
	Superficielle	2	1	1	1	1			
Valvulopathies	Simple	2	1	1	1	1			
	Complicées <sup>3</sup>	4	1	1	2*	2*			
Lupus érythémateux systémique	Antiphospho +	4	3	3	1	3			
	Thrombopénie	2	2	I = 3	C = 2	I = 3*	C = 2*	2*	
	TTT immuno -	2	2	2	I = 2	C = 1	2		
	Aucune CI	2	2	2	1	2			
Fact. de risque cardio-vasc. <sup>2</sup>	3 - 4*	2*	2*	1	2				
Tabac	< 35 ans	2	1	1	1	1			
	≥ 35 ans, < 15/j	3	1	1	1	1			
	≥ 35 ans, ≥ 15/j	4	1	1	1	1			
HTA	non suivie	3*	2*	2*	1	2			
	contrôlée, suivie	3*	1*	1*	1	1			
	S ≥ 140 II D ≥ 90	3	1	1	1	1			
	S ≥ 160 II D ≥ 100	4	2	2	1	2			
	Complic. vasculaire	4	2	2	1	2			
	de grossesse isolée	2	1	1	1	1			
Infarct. Myoc.	même si ATCD	4	I = 2	C = 3	I = 2	C = 3	1	I = 2	C = 3
AVC	ATCD	4	I = 2	C = 3	I = 2	C = 3	1	2	
Dyslipidémie		2*	2*	2*	1*	2*			

\* Facteurs de risque veineux du post-partum : antécédents de thrombose veineuse (SIC), thrombophilie (SIC), immobilisation, transfusion maternelle à la naissance, IMC > 30 kg/m<sup>2</sup>, hémorragie de la délivrance, accouchement actuel par césarienne, pré-éclampsie, tabagisme



		Oestro-progestatifs		Progestatifs oraux		Nexplanon°		DIU Cuivre		SIU Mirena°	
Céphalées	Hors migraine	I = 1*	C = 2*	1*		1*		1*		1*	
	Migraine, âge < 35	I = 2*	C = 3*	I = 1*	C = 2*	2*		1*		2*	
	Migraine, âge ≥ 35	I = 3*	C = 4*	I = 1*	C = 2*	2*		1*		2*	
	Migraine + aura	4*		I = 2*	C = 3*	I = 2*	C = 3*	1*		I = 2*	C = 3*
Epilepsie	f° traitement	1*		1*		1*		1		1	
Dépression		1*		1*		1*		1*		1*	
Tumeur du Seins	Non diagnostiqué	2*		2*		2*		1		2	
	Bénigne	1		1		1		1		1	
	ATCD fam. cancer	1		1		1		1		1	
	Cancer en cours	4		4		4		1		4	
	Rémission > 5 ans	3		3		3		1		3	
Endométriose		1		1		1		2		1	
Ovaires	Bénin, kystes...	1		1		1		1		1	
	Cancer	1		1		1		I = 3	C = 2	I = 3	C = 2
Dysménorrhée		1		1		1		2		1	
Maladie trophoblast.	chute ou hCG -	1		1		1		3		3	
	persistance hCG	1		1		1		4		4	
Col utérin	Ectropion	1		1		1		1		1	
	Dysplasie	2		1		2		1		2	
	Cancer non traité	2		1		2		I = 4	C = 2	I = 4	C = 2
Hémorragie génitale	métrorragies	1		2		2		1		1	
	ménorragies	1*		2*		2*		2*		I = 1*	C = 2*
	non expliquée	2*		2*		3*		I = 4*	C = 2*	I = 4*	C = 2*
Endomètre	Cancer	1		1		1		I = 4	C = 2	I = 4	C = 2
Myomes utérins	Déformants	1		1		1		4		4	
	Cavité normale	1		1		1		1		1	
Malformation utérine	Déformante	1		1		1		4		4	
	Cavité normale	1		1		1		2		2	
Endométrite - Salpingite	Antécédent	1		1		1		2		2	
	+ gross. ultérieure	1		1		1		1		1	
	En cours	1		1		1		I = 4	C = 2*	I = 4	C = 2*
IST	Cervicite en cours	1		1		1		I = 4	C = 2*	I = 4	C = 2*
	Vaginite	1		1		1		2		2	
	Risque élevé	1		1		1		I = 2-3*	C = 2	I = 2-3*	C = 2
HIV <sup>4</sup>	Risque élevé	1		1		1		2		2	
	Séro + SIDA -	1		1		1		2		2	
	SIDA (f° TTT)	1*		1*		1*		I = 3	C = 2*	I = 3	C = 2*
Schistosomiase		1		1		1		1		1	
Tuberculose <sup>4</sup>	Pelvienne	1*		1		1		I = 4	C = 3	I = 4	C = 3
	Autre	1*		1*		1*		1		1	
Diabète	ATCD gestationnel	1		1		1		1		1	
	Non compliqué	2		2		2		1		2	
	Compiqué ou > 20 ans	3 - 4*		2		2		1		2	
Thyroïde	Goitre simple	1		1		1		1		1	
	Hyperthyroïdie	1		1		1		1		1	
	Hypothyroïdie	1		1		1		1		1	
Lithiase vésiculaire	Cholécystectomie	2		2		2		1		2	
	Traitée médical.	3		2		2		1		2	
	En cours	3		2		2		1		2	
	Asymptomatique	2		2		2		1		2	



		Oestro-progestatifs	Progestatifs oraux	Nexplanon°	DIU Cuivre	SIU Mirena°
Cholestase	Gravidique	2	1	1	1	1
	Sous OP	3	2	2	1	2
Hépatite virale	Aiguë ou réact.	I = 3-4* C = 2	1	1	1	1
	Porteur sain	1	1	1	1	1
	Chronique	1	1	1	1	1
Cirrhose	Compensée	1	1	1	1	1
	Sévère	4	3	3	1	3
Tumeurs hépatiques	Hyperplasie NF	2	2	2	1	2
	Adénome	4	3	3	1	3
	Cancer	4	3	3	1	3
Anémies	Thalassémie	1	1	1	2	1
	Drépanocytose	2	1	1	2	1
	Carence martiale	1	1	1	2	1

Antiretro-viraux	ITIN	1*	1	1	I = 2-3* C = 2*	I = 2-3* C = 2*
	ITINN 1	2*	2*	2*	I = 2-3* C = 2*	I = 2-3* C = 2*
	ITINN 2	1*	1	1	I = 2-3* C = 2*	I = 2-3* C = 2*
	Inhib. protéases	3*	3*	2*	I = 2-3* C = 2*	I = 2-3* C = 2*
	Inhib. intégrase	1*	1	1	I = 2-3* C = 2*	I = 2-3* C = 2*
Anti-convulsivants	Phénitoïne	3*	3*	2*	1	1
	Carbamazépine	3*	3*	2*	1	1
	Barbituriques	3*	3*	2*	1	1
	Primidone	3*	3*	2*	1	1
	Topiramate	3*	3*	2*	1	1
	Oxcarbapézine	3*	3*	2*	1	1
	Lamotrigine	3*	1	1	1	1
Antibiotiques	Large spectre	1	1	1	1	1
	Antifongiques	1	1	1	1	1
	Antiparasitaires	1	1	1	1	1
	Rifampicine / rifabutine	3*	3*	2*	1	1

## Légende - Glossaire

1	Hors septique (endométrite...)
2	Multiples : âge, tabac, diabète, HTA...
3	Hypertension pulmonaire, risque de fibrillation auriculaire, antécédent d'endocardite bactérienne subaiguë
4	Attention aux interactions médicamenteuses
5	En cas d'allaitement partiel un oestroprogestatif oral est possible à partir de 6 semaines du post-partum
*	Explications complémentaires dans le livret
I	Initiation : la condition était là avant l'instauration de la contraception
C	Continuation : la condition apparaît ou s'aggrave après l'instauration de la contraception
ITIN	Inhibiteurs de la transcriptase inverse nucléosides : Abacavir (ABC), Tenofovir (TDF), Zidovudine (AZT), Lamivudine (3TC), Didanoside (DDI), Emtricitabine (FTC), Stavudine (D4T).
ITINN 1	Inhibiteurs de la transcriptase inverse non nucléosides : Efavirenz (EFV), Nevirapine (NVP)
ITINN 2	Inhibiteurs de la transcriptase inverse non nucléosides : Etravirine (ETR), Rilpivirine (RPV)
Inhib. Protéases	Ritonavir-boosted atazanavir (ATV/r), Ritonavir-boosted lopinavir (LPV/r).
Inhib. Intégrases	Raltegravir (ral)

# Formagyn : Recommandations OMS contraception d'urgence



	Methode Yuzpe	LNG (Norlevo...)	UPA (Ellaone...)
Grossesse en cours	Non applic*	Non applic*	Non Applic*
Allaitement	1	1	2*
ATCD GEU	1	1	1
Obésité	1*	1*	1*
ATCD Cardiovasculaire	2	2	2
Migraines	2	2	2
Pathologie hépatique sévère	2	2	2
Inducteurs enzymatiques*	1*	1*	1*
Utilisation répétée	1*	1*	1*
Viol	1*	1*	1*

## Légende - Glossaire

\* Inducteurs CYP3A4 par ex : rifampicine, phénitoïne, phénobarbital, carbamazépine, efavirenz, fosphénitoïne, névirapine, oxarbazépine, pirimindone, rifabutine, millepertuis (hypericum perforatum)

Catégorie	Cas individuel et suivi	Cas mal connu
1	<b>On peut utiliser la méthode en toute circonstance</b>	<b>Oui</b> (utiliser la méthode)
2	On peut généralement utiliser la méthode	
3	Pas recommandée sauf si les autres méthodes ne sont pas disponibles ou acceptables	<b>Non</b> (ne pas utiliser la méthode)
4	La méthode ne doit pas être utilisée	