QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Maux de tête ou de ventre, nausées, petits saignements..., sont des effets rares et disparaissent en général rapidement. En cas de doute, parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin.



La pilule du lendemain n'est pas un moyen de contraception mais une solution de **rattrapage**.

Prendre une contraception d'urgence réduit fortement le risque de grossesse, mais ne le réduit pas complètement.

En cas de doute, consultez une sagefemme ou un médecin. Faites un test de grossesse 3 semaines après la date du dernier rapport non protégé.



Y A T-IL UN RISQUE?

Prendre la contraception d'urgence n'empêche pas d'avoir des enfants lorsque vous l'aurez décidé.



CONTACTS UTILES

CEGIDD (Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic VIH et IST) à Jacaranda 1er étage, 7h - 14h du lundi au vendredi 0269 61 84 73 Service Action Santé 7h - 17h

www.choisirsacontraception.fr www.monurgencepilule.fr

0269 81 80 00



Pour vous orienter et répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous contacter



Tél: 0269 62 28 15

Impasse Saïd Hassani M'Nagnochi, quartier Boboka, 97600 Mamoudzou.

www.reseaux-sante-mayotte.fr






CONTRACEPTION D'URGENCE

MBIA YA SUKU YA VHILI

J'ai eu un rapport sexuel non ou mal protégé ?*



Je prends la pilule du lendemain le plus rapidement possible!




* Un préservatif qui craque, une pilule oubliée ou pas de contraception = risque de grossesse.





DANS QUELLE SITUATION DOIS-JE PRENDRE LA PILULE DU LENDEMAIN?





- Le préservatif s'est déchiré ou enlevé lors du rapport ?
- ✓ Vous avez oublié votre pilule (+12h) ET eu un rapport non protégé (dans les 5 jours précédents ou les 7 jours suivant l'oubli)?

COMMENT PRENDRE CE COMPRIMÉ?



La pilule d'urgence est à prendre le plus tôt possible, de préférence dans les 12h pour plus

d'efficacité, après le rapport sexuel non ou mal protégé.

À prendre **au plus tard dans les 3 ou 5 jours après le rapport** (en fonction du type de pilule d'urgence).

Si dans les 3 heures suivant la prise du comprimé, des vomissements et diarhées surviennent, il est nécessaire de reprendre un comprimé (contraceptif d'urgence).

QUE FAIRE APRÈS LA PRISE DU CONTRACEPTIF D'URGENCE?

- Si vous avez pris la contraception d'urgence suite à un rapport non ou mal protégé (pas de préservatif ou incident)
 - Utilisez à chaque rapport une contraception locale, jusqu'au retour de vos règles (préservatif féminin ou masculin).
- Si vous avez pris la contraception d'urgence suite à un oubli de pilule
 Prenez le dernier comprimé oublié dès la constatation et continuez la prise régulière de votre pilule à l'heure habituelle.

Celle-ci ne redeviendra efficace qu'au bout de 7 jours de prise de comprimés actifs. Pendant ces 7 jours, protégez-vous avec un préservatif, à chaque rapport.



Prenez rendez-vous auprès d'une sage-femme, d'un médecin ou au CeGIDD* pour vérifier que vous n'avez pas été contaminé par une IST (VIH, hépatite B, chlamydia, herpès génital...).



Faites un test de grossesse 3 semaines après la date du dernier rapport non protégé.

Vous pourrez discuter sur le choix d'une contraception régulière plus efficace (DIU, pilule, implant...) avec un professionnel de santé.



OÙ TROUVER LA PILULE DU LENDEMAIN?

En pharmacie (sans ordonnance, gratuite et anonyme pour les -18 ans)

De façon anonyme et gratuite :

- Auprès de **l'infirmière scolaire** du collège ou du lycée
- Dans les **PMI**
- Dans les **maternités** périphériques 24h/24h (Dzoumogné, Petite Terre, Kahani, Mramadoudou)
- **Q** CeGIDD* Jacaranda 1er étage



^{*} CeGIDD : Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic VIH et IST.